U.S. Wheat Associates
Reporte de cosecha
25 mayo, 2018

Hard Red Winter

La cosecha 2018/19 de HRW está en marcha en Texas y el sur de Oklahoma. Ésta debería comenzar a moverse hacia el norte este fin de semana, dependiendo del clima, con muestras que llegarán poco después. Se esperan condiciones de sequía a severa en las Planicies del Sur estimulen un ritmo de cosecha bastante rápido hasta principios de julio. El potencial de rendimiento es mejor al norte de la frontera de Nebraska/Kansas y en el este-centro y noreste de Colorado. En general, una cantidad significativa de trigo de la cosecha anterior permanece almacenada, aunque los agricultores han aumentado sus ventas recientemente. Los compradores pueden anticipar al menos niveles de proteína un poco más altos en lo que se espera sea una cosecha de HRW incluso más pequeño para 2018/19. USDA estima que se plantó un área de 23.2 millones de acres de HRW y pronostica una producción total de HRW de 17.6 MMT o cerca de 647 millones de bushels, que sería la producción más baja desde 2006/07. La industria anticipa que los primeros datos de calidad de HRW estarán disponibles a mediados de junio.

	DATOS DEL TRIGO								FACTORES DE GRADO						☐ Final
	Muestra		Humedad	Proteína	Proteína Base Seca	*Dockage*	Peso de Mil Granos	FN	Grado	Peso Específico		Materia Extraña	Daño Total	Chupados y Quebrados	Defectos
	Analizadas	Esperadas	%	%	%	%	gm	sec		lb/bu	kg/hl	%	%	%	%
Esta Semana															
Última Semana															
2017 Final	488	488	10.6	11.4	13.0	0.6	31.8	367	1 HRW	60.8	80.0	0.1	0.1	0.9	1.1

Soft Red Winter

Si bien el progreso de la cosecha de SRW está un poco por debajo de lo normal debido a las frías condiciones de la primavera, la cosecha está en marcha en el sur y comenzará pronto en el sudeste. Como en 2017, las muestras vendrán de Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Tennessee, Alabama, Carolina del Norte, Virginia y Maryland, y la recolección debería comenzar la próxima semana. Sin embargo, toda la región de muestreo experimentó condiciones de lluvia esta semana, que se espera continúen durante el fin de semana. USDA estimó que los agricultores plantaron 5.98 millones de acres de SRW el otoño pasado, un aumento del 4% sobre la cosecha 2017/18. El 5 de mayo de 2018, el USDA pronosticó una producción de SRW de 8.6 MMT o alrededor de 315 millones de bushels, un 8% más que en 2017/18. Los informes iniciales sugieren que los compradores deben esperar que el potencial de rendimiento SRW, el peso específico y la proteína estén cerca del promedio.

	DATOS DEL TRIGO								FACTORES DE GRADO						☐ Final
	Muestra		Humedad	Proteína	Proteína Base Seca	*Dockage*	Peso de Mil Granos	FN	Grado	Peso Específico		Materia Extraña	Daño Total	Chupados y Quebrados	Defectos
	Analizadas	Esperadas	%	%	%	%	gm	sec		lb/bu	kg/hl	%	%	%	%
Esta Semana		300													
Última Semana															

2017 Final	270	270	12.7	9.5	10.8	0.4	34.2	320	2 SRW	58.8	77.4	0.1	1.1	0.5	1.7

Hard Red Spring

USDA informa que la siembra aumentó rápidamente en las últimas dos semanas. La siembra es ahora casi normal, excepto en Montana, donde las condiciones húmedas han mantenido a muchos agricultores fuera de sus campos. Las previsiones iniciales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indican una mayor siembra y producción de trigo de primavera para 2018/19 en comparación con 2017/18.

	DATOS DEL TRIGO								FACTORES DE GRADO							☐ Final
	Muestra		Humedad	Proteína	Proteína Base Seca	*Dockage*	Peso de Mil Granos	FN	Grado	Peso Específico		Materia Extraña	Damage	Chupados y Quebrados	Daño Total	DHV
	Analizadas	Esperadas	%	%	%	%	gm	sec		lb/bu	kg/hl	%	%	%	%	%
Esta Semana																
Última Semana																
2017 Final	476	476	11.9	14.6	16.6	0.6	31.0	397	1 DNS	61.2	80.5	0.0	0.1	0.9	1.0	76

Soft White

Las condiciones en el Noroeste-Pacífico generalmente han sido buenas para la cosecha 2018/19 de trigo SW. Aproximadamente el 44% de la cosecha de Oregon ha emergido; la emergencia es mayor a 30% en Washington y mayor a 20% en Idaho. La cosecha debe comenzar en un horario normal a fines de junio o principios de julio, dependiendo de las temperaturas y la lluvia antes de la madurez de las plantas. USDA informa que el área sembrada de SW estuvo cerca del promedio y actualmente espera que los agricultores produzcan 5.66 MMT o alrededor de 208 millones de bushels de trigo de invierno SW para 2018/19.

	DATOS DEL TRIGO								FACTORES DE GRADO							☐ Final
	Muestra		Humedad	Proteína	Proteína Base Seca	*Dockage*	Peso de Mil Granos	FN	Grado	Peso Específico		Materia Extraña	Daño Total	Chupados y Quebrados	Defectos
	Analizadas	Esperadas	%	%	%	%	gm	sec		lb/bu	kg/hl	%	%	%	%
Esta Semana															
Última Semana															
2017 Final	512	400	8.9	9.6	10.9	0.5	35.5	335	1 SW	60.9	80.0	0.1	0.0	0.5	0.6

Durum

USDA actualmente prevé una mayor siembra de trigo durum del norte y un aumento en la producción total de trigo durum para 2018/19.

	DATOS DEL TRIGO								FACTORES DE GRADO							☐ Final
	Muestra		Humedad	Proteína	Proteína Base Seca	*Dockage*	Peso de Mil Granos	FN	Grado	Peso Específico		Materia Extraña	Daño Total	Chupados y Quebrados	Defectos	HVAC
	Analizadas	Esperadas	%	%	%	%	gm	sec		lb/bu	kg/hl	%	%	%	%	%

Esta Semana																
Última Semana																
2017 Final	121	113	11.1	14.5	16.5	1.0	36.9	384	1 HAD	60.4	78.7	0.0	0.1	1.1	1.2	83

Results shown represent all samples collected through this and last week respectively.

Legend: Protein = 12% Moisture Basis; TKW = 1000 Kernel Weight; FN = Falling Number; FM = Foreign Material; S&B = Shrunken and Broken; n/a = not available.